

# FÁRMACOS PARA LA ADICCIÓN A LOS OPIOIDES (HEROÍNA, FENTANILO, OXICODONA)

## 1 METADONA


Es un opioide sintético agonista, de acción prolongada, que se une a los mismos receptores cerebrales que la heroína y la oxycodona, pero sin producir un estado de euforia. Según [MedlinePlus](#), reduce el síndrome de abstinencia y el deseo de consumir opioides, permitiendo una recuperación más estable.

## 2 BUPRENORFINA

Es un agonista parcial opioide, lo que significa que activa los receptores opioides, pero con menor intensidad que la heroína o la metadona.

## 3 NALTREXONA

Es un antagonista opioide que bloquea los efectos de los opioides en el cerebro, eliminando cualquier sensación de placer asociada con su consumo. [La naltrexona, según MedlinePlus](#), evita recaídas al impedir que la persona experimente los efectos de los opioides si los consume.



# MEDICAMENTOS PARA LA ADICCIÓN A LA NICOTINA

## 1 VARENICLINA

Conocida por su marca Champix, la vareniclina reduce los síntomas de abstinencia al imitar parcialmente la acción de la nicotina sin sus efectos dañinos. Aunque eficaz, puede causar náuseas, insomnio y alteraciones en el sueño.

## 2 BUPROPIÓN

Es un antidepresivo que reduce los antojos de nicotina al alterar neurotransmisores como dopamina y norepinefrina.

## 3 TERAPIAS DE REEMPLAZO

Parques, chicles y aerosoles nasales proporcionan nicotina de forma controlada, ayudando a reducir los síntomas de abstinencia. Según el NIDA, las TRN son útiles para aliviar estos síntomas y facilitar el proceso de dejar de fumar.



# FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO

## 1 NALTREXONA

Bloquea los efectos del alcohol en el cerebro, eliminando las sensaciones de recompensa asociadas con su consumo. Ayuda a prevenir recaídas al reducir el deseo de beber.

## 2 DISULFIRÁM

Conocido por su marca Antabuse, el disulfirám provoca reacciones adversas graves si la persona consume alcohol, lo que actúa como un fuerte disuasivo.

## 3 ACAMPROSATO

Ayuda a reducir los síntomas de abstinencia y los antojos de alcohol, estabilizando el equilibrio químico en el cerebro



# TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PARA LA ADICCIÓN A ESTIMULANTES



## **MODAFINILO**

Aunque originalmente se utiliza para tratar trastornos como la narcolepsia, algunos estudios sugieren que el modafinilo podría ser útil en el tratamiento de la adicción a la cocaína.



## **BACLOFENO**

Este medicamento, utilizado generalmente para tratar espasmos musculares, también ha mostrado potencial en la reducción de los antojos y la ansiedad relacionada con la adicción a las metanfetaminas.



## **DESIPRAMINA**

Este antidepresivo de la clase de los inhibidores de la recaptación de norepinefrina (IRSN) ha demostrado eficacia en la reducción de los síntomas de abstinencia en personas con adicción a la cocaína.

